

# 국제 리마프로스트 정

(리마프로스트알파-시클로덱스트린포접화합물)

### [성분·함량] 이 약 1정 중

리마프로스트알파-시클로덱스트린포접화합물(JP) .....166.67 $\mu$ g  
(리마프로스트로서 5 $\mu$ g)

### [성 상] 흰색의 원형 정제

### [효능·효과]

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 괴양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선

### [용법·용량]

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 괴양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 2정을 경구투여합니다.
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 1정을 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

### [사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
  - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.
  - 1) 출혈경향이 있는 환자(출혈을 조장할 우려가 있습니다.)
  - 2) 항혈소판제, 혈전용해제, 항응고제를 투여중인 환자
3. 부작용
  - 1) 과민증 : 때때로 발진, 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등의 적절한 조치를 취해야 합니다.
  - 2) 출혈경향 : 드물게 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여, 이상이 보이는 경우에는 투여를 중지합니다.
  - 3) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 복부불쾌감, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림, 드물게 구토, 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.
  - 4) 간장 : 때때로 AST(GOT), ALT(GPT) 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있습니다.
  - 5) 순환기계 : 때때로 심계항진, 드물게 사지청색증, 저혈압이 나타날 수 있습니다.
  - 6) 기타 : 때때로 두통, 안면홍조, 어지러움, 열감, 드물게 전신권태감, 무중, 유선종창, 몸떨림, 하지다모(下肢多毛), 빈혈이 나타날 수 있습니다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 요부척추관협착증에 대해서는 증상의 경과를 관찰하여 지속투여의 여부를 결정합니다.
- 2) 요부척추관협착증에서 수술을 받아야 할 정도의 중증례에서의 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

### 5. 임부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 동물실험(임신한 원숭이·랫트에 정맥주사)에서 자궁수축작용이 보고되어 있습니다.

### 6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 없습니다).

### 7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

### 8. 기타

건강한 성인에게 대량투여(30~40 $\mu$ g/회)시 일시적인 혈압강하가 나타났다는 보고가 있습니다.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **[유효기간]** 제조일로부터 36개월 **[포장단위]** 자사포장단위

- \* 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.
- \* 사용기한·유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품들은 약국등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
- \* 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
- \* 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL. 031-781-9081/9)또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

\* 2002년 7월 1일 이후부터 제조를 책임법이 시행되고 있습니다.  
 \* 의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다.
2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.
3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

가장 좋은 약은 사랑입니다.



제조의뢰자  
**국제약품공업주식회사**

경기도 안산시 단원구 초지동 648번지  
http://www.kukjepharm.co.kr  
제조사 : 풍림무약주식회사  
경기도 화성시 향남면 상신리 906-1