

사용전에 첨부문서를 숙지 하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
분류번호 219
KGMP 적격업체



(01)98089347343408

뇌 및 말초 혈액순환장애 치료제

징코크린정 120mg | 은행엽엑스 |

제 품 명

징코크린정 120mg(은행엽엑스)

원료약품 및 그 분량 내수용 1정(295.6mg) 중

은행엽엑스(생구) 120.0mg

(총 킵고플라본배당체로서 28.8mg)

첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래) : 유당수화물(KP)/소/우유

성 상

녹색의 원형 필름코팅정(내수용)

효능 · 효과

1. 말초동맥 순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거리기))의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3. 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

용법 · 용량

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽 엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다. (먹는다, 복용한다)
 - 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽 엑스로서 1회 40-80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여 한다. (먹는다, 복용한다)
2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 않것.

- 1) 이 약에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍 증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상 사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포 장 단 위

자사포장단위

사용기간

제조일로부터 36개월

제 조 의 자

정우신약(주) 총남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

제 조 자

알리코제약(주) 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

판 매 자

(주)대웅생명과학 서울시 송파구 삼전로 42

※ 개정일자(2019년 05월 20일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인 할 수 있습니다.

※ 소비자 상담실 (02-574-2541)

※ 상기 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.



Rev. No. 02