

셀트리온 HMT-M11-01  
트리메부틴말레산염정

조제용  
일반의약품  
분류번호:239

위·장관 운동조절제  
셀트리온

트리메부틴말레산염정

Celltrion

Trimebutine Maleate Tab.

**【원료약품 및 분량】** 1정 중

- 유효성분 : 트리메부틴말레산염(KF) ..... 200mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호
- 동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스

**【성 상】** 연한 노란색의 원형정제

**【효능·효과】**

1. 주요효 효과  
1) 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장장애 있어서의 소화기능이상(복통(배앓), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 경장
- 3) 소화 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장염통과장애(변비, 설사), 동요(안절부절)자극, 수면장애

**【용법·용량】**

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다).  
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.  
이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(정당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

**2. 부작용**

- 1) 소화기계 : 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구강(목아름), 구내(입안)아비강 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 편두통, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

**3. 임부에 대한 투여**

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유효성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

**4. 수유부에 대한 투여**

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다.

**5. 다음 환자에는 신중히 투여할 것**

이 약은 황색 4호(타르트린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알러지 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

**【저장방법】**

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**【사용기간】**

제조일로부터 36개월

**【포장단위】**

30정, 300정

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실 : 080-850-3611(~2) 수신자부담)
- ※ 이 제품 설명서 작성일자(하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.celltrionph.com) 또는 의약품통합정보시스템(<http://redug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.

작성일자 T-2019.04.29  
관리번호 HMT-M11-03

제조의회사 :

CELLTRION  
총합동 건국로 이화여자병원 47-17  
www.celltrionph.com

제조자 :

진양제약  
경동 한주시 자영면 신촌로 34