

일반의약품  
분류번호:114

# 크로나펜 정

우수약품제조  
K G M P  
적격업체제품

## 【제품명】 크로나펜정

## 【원료약품 및 그 분량】 1정(700mg) 중

- 유효성분  
아세트아미노펜(KP) ..... 300mg  
클로르록사존(KP) ..... 250mg
- 첨가제(동물유래성분) ; 유당수화물(소·우유)
- 기타첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 포비돈K30, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘

## 【성상】 백색의 장방형 정제

## 【효능효과】

신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통, 건통, 근경련, 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질한

## 【포장단위】 10정

【용법용량】 성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복시를 피하여 복용하십시오.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관, 제조일로부터 36개월

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

### 2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

### 3. 복용시 주의사항

1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
- ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
- ③ 천식이 나타난 경우

2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

### 4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 심한 간, 신장애 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

### 5. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈, 반상출혈, 요변색 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈고나신경성 부종 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있습니다.
- 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지하십시오.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.
- 4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.

### 6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여하십시오.

### 7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용투기시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여하십시오.

### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 약을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

### 9. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

첨부문서 개정년월일 : 2018.05.28

1805(ver.01)

**Kyoungbang**

경방신약주식회사  
인천광역시 남동구 남동대로394(남동동, 남동공단 339/8L)  
소비자상담실 : 032.822.4322  
http://www.kbpharm.com

※ 자세한 사항은 식품의약품 안전처 온라인 의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펴한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.