우울증, 신경성 식욕과항진증

전문의약품
분류번호:117

노르작캡슐 10mg/20mg

(플루옥세틴염산염)

【원료약품·분량】 1캡슐 중

노르작캡슐 10mg
- 유효성분: 플루옥세틴염산염(USP)········11.2mg(플루옥세틴으로서 10mg)
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색203호
- 기타 첨가제: 전분글리콜산나트륨, 전호화전분, 캡슐, 콜로이드성이산화규소

노르작캡슐 20mg
- 유효성분: 플루옥세틴염산염(USP)········22.4mg(플루옥세틴으로서 20mg)
- 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호
- 기타 첨가제: 상하 미황색의 경질캡슐제, 전분글리콜산나트륨, 전호화전분, 콜로이드성이산화규소

【성상】 노르작캡슐 10mg: 흰색 내지 회백색의 분말을 함유한 상·하부 연녹색의 경질 캡슐제
노르작캡슐 20mg: 흰색 내지 회백색의 분말을 함유한 상·하부 미황색의 경질 캡슐제

【효능·효과】
1. 우울증 : 이 약의 효과는 DSM-Ⅲ 범주의 우울증과 매우 유사한 것으로 진단 받은 우울증 외래환자의 치료시 5~6주 이내에 나타났다. 우울증은 보통 일상 기능을 방해하는 정도로 현저한 지속적인 우울상태 또는 불쾌감(최소한 2주간 거의 매일)을 말하며 최소한 다음 8가지 증상 중 4가지 이상을 포함해야 한다 : 식욕의 변화, 수면의 변화, 정신운동의 격정 또는 지둔, 일상생활에 흥미의 결여 또는 성적 욕구의 감소, 피로감의 증가, 죄의식 또는 쓸모 없다는 느낌, 사고의 둔화 또는 집중력의 저하, 자살시도 또는 자살에 대한 생각. 입원한 우울증 환자에 대한 이 약의 항우울 작용은 지금까지 적절히 연구되지 않았으며 5~6주 이상 장기 투여에 대한 유효성은 대조 시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기 투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성을 정기적으로 재평가한다.
2. 신경성 식욕과항진증 : 이 약은 위약 투여군과 비교했을 때 탐식과 시하행동에서 유의성 있는 감소를 나타냈다. 이 약의 16주 이상 장기투여에 대한 유효성은 대조시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성을 정기적으로 재평가한다.
3. 강박반응성 질환 : 이 약은 이중맹검, 위약대조 임상시험에서 강박반응성 질환의 증상을 유의성 있게 감소시켰다. 강박관념 또는 강박행위를 갑자기 경험하게 되고, 개인의 사회생활 또는 직장 생활이 상당히 고통스럽게 되며 시간을 소비하게 되거나 상당히 방해받게 된다. 이 약의 13주 이상 장기투여에 대한 유효성은 대조시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유용성을 정기적으로 재평가한다.
4. 월경전 불쾌장애 : 월경 전 불쾌감 증상은 우울, 불안, 정서적 불안정과 같은 증상이 뚜렷하고, 증상들이 주기적(월경주기에서 황체기의 마지막주)으로 나타나고 월경이 시작되면

【포장단위】 30캡슐, 200캡슐

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(http://drug.mids.go.kr)의 '의약품 검색'란을 참고하세요.
※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 합니다.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.koreapharma.co.kr) 또는 (☎ 02-558-1277)에서 확인할 수 있습니다.

건강한 미래 아름다운 동행
KP 한국파마 KOREA PHARMA
www.koreapharma.co.kr
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

제품문의처 02)558-1277(마케팅)
전개정년월일 2017.08.17
최종개정년월일 2018.08.30
NRZ-I-1801