

티알부틴정

(트리메부틴말레산염)

일반의약품 조제용

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) 100.0 mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨

【효능효과】

1. 주요능 효과
1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

【용법용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200 mg 1일 3회 식전에 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응
1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안) 마비감 등이 나타날 수 있다.
2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
3. 수유부에 대한 투여
수유 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【성상】 흰색의 원형 정제

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30 T/병, 500 T/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【수신자부담고객상담실】 080-988-8889

【제조회자】 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
인터넷홈페이지 : <http://www.choa.co.kr>

【제조사】 (주)노바엘헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의 깊게 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mds.go.kr>)를 참조하십시오.

의약품 사용 후 부작용 발생 시, **부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원에** 할 수 있습니다.

신상법민 ☎ 1644-6223, 14-3330 | □ karp.drugsafe.or.kr
신정대성 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족
보성법민 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

개정연월일 : 2024. 01. 16 (Rev.0)

조아제약(주)
CHOA PHARM. CO. LTD.