

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문 의약품

정맥 · 림프기능부전 및 림프부종 증상개선제

분류번호 : 219

엔테론[®] 정 150mg

ENTELON Tab. 150mg

포도씨건조엑스(Vitis Vinifera Seed Dried Extract)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

포도씨건조엑스(Vitis Vinifera Seed Dried Extract)(별규)..... 150mg
첨가제(식약청 인정 타르색소) : 황색4호 · 황색5호 · 청색2호 알루미눔레이크

【성상】 황색의 원형 장용성 필름코팅정

【약리작용 · 특징】

Flavonoids로 구성된 Procyanidolic oligomer는 혈관벽에 있는 Collagen, Elastin을 선택적으로 보호하여 Collagen의 결합을 강화시켜 모세혈관의 거대분자구조를 변형시킵니다. 이러한 작용으로 모세혈관의 과투과성을 감소시키고 모세혈관의 저항을 증가시켜 혈관 및 림프부종을 치료합니다.

엔테론정150밀리그램은 Procyanidolic oligomer를 함유한 비티스비니페라건조엑스(포도씨추출물)을 주성분으로 하며, 림프기능부전으로 인한 정맥질환 및 림프부종등의 증상을 개선시켜주는 역할을 합니다.

【효능 · 효과】

1. 정맥림프 기능부전과 관련된 증상개선(하지도종창, 통증, 하지불안증상)
2. 유방암 치료로 인한 림프부종(특히, 피부긴장의 자각증상)의 보조요법제로 물리 치료 시 병용

【용법 · 용량】

1. 정맥림프 기능부전과 관련된 증상의 개선
성인 : 포도씨건조엑스로서 1일 300 mg(2정)을 1일 2회 분할 투여한다.
2. 유방암 치료로 인한 림프부종 : 이 약으로서 1일 300 mg(2정), 1일 2회 분할 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3 이상반응

- 1) 알레르기 반응
드물게 두드러기, 가려움을 동반하거나 동반하지 않는 피부발진, 광과민성, 습진과 같은 피부반응이 보고되었다. 이러한 반응은 투여 중단 시 사라진다. 매우 드물게 췌장 부종이 보고된 바 있다.
- 2) 드물게 위통, 구역, 설사과 같은 위장관계 이상반응이 나타날 수 있다.
- 3) 매우 드물게 두통이 나타날 수 있다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 어떠한 최기형성 효과도 나타나지 않았다. 동물에 대한 최기형성효과가 없으므로, 사람에게 기형적 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. 실제로 지금까지 사람에게 기형을 유발하는 것으로 알려진 물질들은 두 종의 동물에 대해 최기형성을 나타내는 것으로 증명 되었다. 임상적 사용에서, 현재까지 이 약의 최기형성 및 태아독성이 관찰된 바 없다. 그러나 임부에 대한 이 약의 사용경험에 대한 모니터링 결과만을 통하여 이 약의 모든 위험성을 배제하기는 불충분하므로, 이 약은 임부에게 반드시 필요한 경우에만 사용되어야 한다.
- 2) 이 약이 모유로 이행되는지에 대한 자료가 없으므로 이 약으로의 치료 중 수유는 권장되지 않는다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 곳에 마개를 꼭 막아 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보증을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않도록 한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

60정, 300정

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주시시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2013. 12. 23)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '04. 09. 30
설명서 개정년월일 : '13. 12. 23
제품의 사용기한은 내부용기에 표기
P32278-12

제조·판매원
 **한림제약 주식회사**
공장: 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27
<http://www.hanlim.com>

기술제휴:

sanofi aventis

사노피-아벤티스
서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)