

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 보관하십시오.

전문의약품
분류번호 232

위염·위궤양 치료제

슈넬레바미피드정

(레바미피드)

원료약품 및 그 분량 1정 중

레바미피드(KPC).....100.0mg

성상

백색의 원형 필름코팅정제

효능·효과

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란(짓무름), 출혈, 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기))의 개선: 급성 위염, 만성위염의 급성악화기

용법·용량

1. 위궤양
보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여하십시오.
2. 다음 질환의 위점막병변(미란(짓무름), 출혈, 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기))의 개선: 급성 위염, 만성위염의 급성악화기
보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 경구투여하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약 성분에 과민증 병력 환자
2. 이상반응
여기서 ‘드물게’ 는 0.1% 미만을, ‘때때로’ 는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미합니다.
 - 1) 중대한 이상반응
 - ① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명): 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - ② 간기능장애(드물게, 황달(빈도불명)): AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 2) 기타 이상반응
 - ① 과민증: 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지하십시오.

- ② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다.
- ③ 소화기 : 구갈(목마름), 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통(배아픔), 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다.
- ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있습니다.
- ⑤ 기타 : 유선 부종(부기), 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경 이상, 심계항진(두근거림), 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨 또는 드물게 BUN 상승, 부종(부기), 인두부 이물감 등이 나타날 수 있습니다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우뚱)한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피하십시오.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다.)

5. 고령자(노인)에 대한 투여

고령자(노인)에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비고령자(노인)와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의하십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

포장단위

자사포장단위

저장방법

차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2012년 07월 23일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품 전자민원창구(ezdrug.kfda.go.kr)의 '의약품등 정보' 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

슈넬 생명과학(주)

Schnell Biopharmaceuticals, Inc.
경기도 안산시 단원구 목대로 125