

뉴록심 정

(세 푸록심 악세사)

광범위 세팔로스포린계 항생제

전문의약품
분류번호 618

NEWROXIME Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

유기성분 : 세푸록심액세틸(KP)-300,72mg(역가)

기타첨가제 : 리우릴륨산나트륨, 미결정셀룰로오스스테아르산마그네슘, 오파드라이03B28796 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 코포비돈크로스카르멜로우스나트륨

■ 성상

흰색의 정방형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

○ 유효균종

1) 협기성 그람양성균

황색포도구균(메치실린 감수성 균주, 페니실리나제 생성균 포함), 화농성연쇄구균, 베타용혈성 연쇄구균, 코아글라제 음성 포도구균(Coagulase negative staphylococcus)(메치실린 감수성 균주), 페렴연쇄구균*

2) 협기성 그람음성균

대장균, 글레브시엘라 속(페리간균 포함, 단 페리간균 중 ESBL 생성균주 및 카바페니메이즈 생성균주 제외), 프로테우스 미란빌리스*, 프로비엔시아 속*, 인플루엔자균(암피실리나제 생성균 포함), 모락셀라 카터알리스, 파리안플루엔자균, 임균(페니실리나제 및 비페니실리나제 생성균 포함), 시트로박터 속*(시트로박터 프렌디 제외), 엔테로박터 속*(엔테로박터 에어로게네스균 및 엔테로박터 글로이케 제외), 프로테우스 속*(프로테우스 펜니리 및 프로테우스 불가리스 제외)

3) 협기성 그람양성균

펩토연쇄구균 속, 글로스트리듐 속*(글로스트리듐 디파실리 제외), 프로포니아박테륨 속

4) 협기성 그람음성균

박테로이데스 속*(박테로이데스 프리길리스 제외), 푸소박테륨 속*

5) 스피로하이드

보렐리아 부르그도르페리

* 획득내성이 문제가 될 수 있는 균종(Species for which acquired resistance may be a problem)에 해당함.

○ 적응증

세푸록심은 베타락티마제에 매우 안정하며 대부분의 암피실린 및 아목시실린 내성 균주에 대하여도 효과를 나타내는 광범위 살균성 세팔로스포린계 항생물질이다.

- 상기 및 감염증 : 종이염, 부비동염, 편도염, 인두염 등

- 하기도 감염증 : 급·慢성기관지염, 폐렴 등

- 비뇨생식기계 감염증 : 신우신염, 방광염, 요도염 등

- 피부 및 연조직감염증 : 종기증, 농피증, 농기증 등

- 임질 : 단순임금성임금성요도염, 임금성자궁경관염

■ 용법 · 용량

- 최적의 흡수를 위하여 식후에 복용해야 한다.

○ 성인 및 12세 이상의 소아

대부분의 감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다. 중증 하기도 감염증 또는 폐렴이나 중증의 감염증, 저감수성균에 의한 감염증이 의심될 때는 1일 2회, 1회 500mg을 투여한다.

요로감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다. 단순임질의 경우 1g을 1회 투여한다.

○ 유아 및 12세 미만의 소아

대부분의 감염증에는 1일 250mg을 1일 2회 투여한다. 단, 2세 이상의 종기증환자에게는 1회 250mg을 1일 2회 투여한다. 3개월 미만의 영아에 대해서는 사용된 경험이 부족하다.

- 스트립토콕쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에 있어서는 7~10일간 이 약을 투여해야 한다.

○ 신경 장애 환자

세푸록심은 주로 신장으로 배출된다. 신기능이 현저하게 손상된 환자들에서 느려진 배출을 보상하기 위해 아래와 같이 세푸록심의 용량을 감량하는 것이 권장된다.

크레이아티닌 청소율	T _{1/2} (시간)	권장 용량
≥ 30 mL/분/1.73m ²	1.4 ~ 2.4	용당 조절 불필요 (표준 용량: 1일 2회, 1회 125mg~500mg)
10 ~ 29 mL/분/1.73m ²	4.6	24시간마다 표준 단일용량 투여
< 10 mL/분/1.73m ²	16.8	48시간마다 표준 단일용량 투여
혈액투석 중인 환자	2 ~ 4	각 투석 종료 시점에 표준 단일용량을 추가 투여

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

세팔로스포린계 항생물질에 과민반응의 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.

1) 페니실린계 또는 다른 베타락탐계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 본인 또는 부모, 형제에 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자

3) 중증의 신장애 환자

4) 경구설파이 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 이상반응

약을 이상반응은 일반적으로 경도이고 일시적이다.

이상반응 대부분이 발생률을 산정할 수 있는 적절한 자료(예를 들어, 위약 대조 시험 자료)를 가지고 있지 않으므로 아래의 이상반응 빈도 범주는 추정치이다. 또한 이 약과 관련있는 이상반응의 발생률은 적응증에 따라 다를 수 있다.

이상반응 중 '매우 흔하게' ~ '드물게'에 해당하는 이상반응의 빈도는 임상시험 자료로부터 결정되었고, 모든 다른 이상반응의 빈도(즉, <1/10,000로 발생한 사례들)는 주로 시판 후 자료로부터 결정되었고, 이들은 실제 빈도보다는 보고된 비율을 나타낸다.

빈도 분류에 다음과 같은 용어를 사용한다 : 매우 흔하게(>1/10), 흔하게(>1/100, <1/10), 흔하지 않게(>1/1000, <1/100), 드물게(>1/10000, <1/1000), 매우 드물게(<1/10000).

감염 및 감염증

- 흔하게 : 칸디다 과도증식

혈액 및 림프계

- 흔하게 : 호산구 증가

- 흔하지 않게 : 콤스시험 양성, 혈소판 감소, 백혈구 감소(기침 백혈구 초감소), 과립구 감소

- 드물게 : 적혈구 감소, 해모글로빈 감소, 헤마토크리트 감소

- 매우 드물게 : 용혈성 빙혈

세팔로스포린계는 적혈구 표면에서 흡수되는 경향이 있고 항체와 직접적으로 반응하여 콤스시험 양성이 나타나거나(이것은 혈액 적합시험을 방해할 수 있다) 매우 드물게 용혈성 빙혈을 일으킬 수 있다.

면역계

과민반응은 다음과을 포함한다.

- 흔하지 않게 : 피부발진

- 드물게 : 두드러기, 가려움

- 매우 드물게 : 약물 발열, 혈청병, 아나필락시스

- 안면부종, 림프선종증, 관절통

신경계

- 흔하게 : 두통, 어지러움

경련이 나타날 수 있다. 특히 고령이거나 고열 또는 중증감염이 동반 되었을 때 불안, 초조, 정신착란, 환상이 나타날 수 있다.

소화기계

- 흔하게 : 설사, 구역, 복통을 포함하는 위장 장애

- 흔하지 않게 : 구토, 소화불량, 변비, 식욕부진

- 드물게 : 위막성 대장염, 복부팽만감

호흡기계

드롭게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X-선이상, 호산구증가 등을 수반한 간질성폐렴, 호산구성 폐침윤이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.

간-담도계

- 흔하게 : 간효소의 일시적인 증가 [ALT (SGPT), AST (SGOT), LDH]

- 매우 드물게 : 황달(대부분 담즙율체증증), 간경

신장

가끔 BUN 등의 상승이 나타난 경우가 있고, 급성 신부전 등의 증증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

피부 및 피하조직

- 매우 드물게 : 대형흉반, 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증(발진성 고사용해) 면역계 질환을 또한 치료한다.

비타민결핍증

- 드물게 : 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경영 등)

기타

- 드물게 : 이통, 입주위감각이상, 혀의 마비감, 인두이상감, 구내건조, 심계항진, 습진

4. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.

2) 속 등의 반응을 예측할 수 있도록 충분히 문진해야 한다.

3) 드롭에 증상이 일으키는 경우가 있으므로 세밀히 관찰해야 하며, 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변비, 이명, 발열 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지해야 한다.

4) 다른 항생물질과 마찬가지로 이 약을 투여시 칸디다의 과도한 증식이 나타날 수 있으며 이 약의 장기간 투여시 비감수성균(장내균群, Clostridium difficile)의 과도한 증식이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 치료를 중단해야 한다.

5) 항생제 사용과 관련하여 경도에서 생명을 위협하는 증증도 병위의 위막성 대장염이 보고되었다. 그러나 항생제 사용기간 동안 또는 사용 후에 설사가 발생한 환자에서 위막성 대장염의 진단을 고려하는 것은 중요하다. 만약 지속적인 또는 유의한 설사가 발생하거나 환자가 경련성 복통을 경험하는 경우, 치료를 즉시 중단하고 환자를 추가적으로 조사하여야 한다.

6) Lyme 병 환자에 투여 시에는 아리시해렉스아이드에 반응이 나타날 수 있다. 이는 Lyme 병의 원인균인 Spirochaete 군과 Borrelia burgdorferi에 대한 이 약의 살균 효과로 인한 적응적인 결과이며, 이러한 증상이 Lyme 병에 대한 항생제 투여시 나타나는 일반적인 현상으로, 일정한 기간이 지나면 소실되거나 쉬울 때마다 다시 나타나야 한다.

7) 순차적 치료방법으로서 경구 치료제로의 변경 시점은 환자의 감염 중증도와 임상 상태, 그리고 관련된 병원체의 감수성에 따라 결정된다. 72시간 이내에 임상적 개선이 없을 경우에는 주시요법이 계속되어야 한다. 순차적 치료방법을 시작하기 전에 세푸록심 나트륨의 처방정보를 참고한다.

8) 이 약은 어지러움을 유발할 수 있으므로 운전 또는 기계조작시 주의를 기울여야 한다.

5. 상호작용

1) 푸로세이드 등의 이뇨제나 아미노글리코사이드 계항생물질과 병용투여 시 신장에 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.

2) 프로벤제이드와 병용투여 시 이 약의 세뇨관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속 시킬 수 있다.

3) 제산제 등 위산 억제제와 병용시 효과가 감소되므로 식사와 함께 복용하는 것이 흡수에 좋다.

4) 다른 항생물질과 마찬가지로 장내균群에 영향을 주어 에스트로겐 재흡수율을 낮추거나 병용하는 경우에 피임제의 효과를 감소시킬 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상화한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 이 약은 모유로 이행되므로 수유부에 투여 시에는 주의해야 한다.

7. 소아에 대한 투여

1) 3개월 미만의 영아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.

2) 경제를 서서 먹을 경우 매우 쓴 맛이 나므로 소아에 투여 시에는 건조시럽제가 추천된다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.

1) 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발현하기 쉽다.

2) 비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있다.

9. 임상검사상에의 영향

1) 베니트리트암, 펠링시약, 클리니네스토에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

2) 직경 콤스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 이 현상은 혈액의 교차시험에 영향을 미칠 수 있다.

3) 혈당 검사를 시행할 때에는 페리사이아나이드 검사에 의해 위음성이 나올수 있으므로 글루코스옥시데이즈나 헥스아이아이드 방법에 의해 측정한다.

4) 이 약은 피크르산 일칼리 방법에 의한 크레이아티닌 검사에 영향을 미치지 않는다.

10. 과량투여시의 치료

세팔로스포린계 약물의 과량투여는 경련을 야기하는 뇌자극을 일으킬 수 있다. 세푸록심의 혈청 농도는 혈액투석이나 복막투석으로 감소될 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿기 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품을 월경 음기에 깨어내 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 월경의 음기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법 : 일제용기, 실온보관(1~30°C)

■ 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위 : 50정(10정/PTPX)

■ 제조자 : 국제약품(주), 경기도 안산시 단원구 산성로 47

■ 제조의뢰자 : (주)동구바이오헤이, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 번화 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2017년 08월 07일)이후 변경된 내용은 식품의약품 안전처 온라인의약품 거래처(www.mfds.go.kr)나 당사 소비자상담실 080-611-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.