

전문의약품



소비자중심경영 인증

니세틸[®]산

(아세틸-L-카르니틴염산염)

NICETILE[®] Powder

(Acetyl-L-carnitine hydrochloride)

[원료약품 및 분량] 이 약 1포(1.5g)중

유효성분 : 아세틸-L-카르니틴염산염(KP) 590mg
(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)

첨가제 : DL-알라닌, 경질무수구산, 글리신, 덱스트린, 사과향코톤, 수크랄로스, 아세실팜칼륨, 에리트리톨, 염화나트륨, 요구르트향코톤

[성상] 이 약은 흰색의 분말입니다.

[효능·효과] 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

[용법·용량] 아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500 mg을 1일 2 ~ 3회 경구투여합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
- 이상반응
이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실됩니다.
이 약을 복용한 환자에서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었습니다.
이 약을 복용한 오독중 환자에서 경증의 근육력증이 보고되었습니다.
- 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있습니다.
- 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태이독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용하도록 하십시오.
※ 국내임상시험결과 추가 제출.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[주의사항] 니세틸산은 흡습성이 있으므로 알루미늄 포장상태로 보관하고 복용직전에 개봉하세요. 니세틸산은 분말제품 특성상 보관 중 공차는 현상이 발생할 수 있으므로 개봉 전 제품을 수회 흔들어 복용하시길 권장합니다.

[포장단위] 60포

[최신정보 확인방법]

최신의 품목허가 또는 신고사항은 홈페이지 (<http://www.donga-st.com>)에서 확인하실 수 있습니다.

[문의전화] 고객센터팀 : 080-920-1001

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

® 등록상표

- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염·손상된 의약품은 구입하였을 때에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

NCP-9G012
첨부문서 작성 : 2012.02
첨부문서 개정 : 2019.07.03

제조판매원



동아에스티

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23 (2B, 3, 4B층)

기술제휴선

ALFASIGMA

