

【용법 및 용량】 1. 성인 및 2세 이상의 유·소아 1) 회충, 요충, 심이지장증, 편충, 아메리카 구충 : 400 mg을 1회 복용한다. 2세 이상의 유·소아의 요충증은, 200 mg을 1회 복용하고 7일 후 200 mg을 반복 복용할 수 있다. 2) 분선충: 1일 1회 400 mg을 3일간 복용한다. 3) 편충의 중증(심한 증상) 혼합 감염시: 1일 1회 400 mg을 3일간 복용한다.

* 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없다.

* 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

【수신자부담고객상담실】 088-988-8888

【사용상의 주의사항】

1. 경고: 이 약에 휴유되어 있는 인공김미제 "아스파탐"은 체내에서 분해되어 폐닐알라닌으로 대사되므로 폐닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 폐닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것. ※ 1일 하용량제한- 아스파탐 함량을 WHO 권장량 (40 mg/kg/1일)이 하로 조정(가능한 최소량 사용)할 것. 60 kg 성인: 1일 최대복용량 2.4 g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에過민반응 환자 2) 일부 3) 2세 미만의 영아(젖먹이) 4) 이 약은 유당(젖당)을 험유하고 있으므로, 갈락토오스 몰내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약物을 복용하지 말 것. 테오필린: 테오필린의 대사를 억제할 수 있다. 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것. 1) 이 약이 모유로 이어되는지에 관해서는 일련의 바 없으나, 이 약 복용시에는 수유를 중단하는 것이 좋다. 2) 이 약은 황색5호(산센엘로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하게거나 알레르기 병력이 있는 환자에서는 신중히 투여한다. 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부침막증후군(스티븐스 존슨증후군), 다형출반(여러 모양의 붉은 반점이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.

2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부(배부분) 또는 복부(배부분) 통증 등의 위장관 장애 또 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 드물게 벌집, 발진, 전신 발적(총혈되어 뿌어짐), 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있다. 4) 기억적인 할모증이 나타날 수 있다. 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신 초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 기임연령(임신 가능성이 있는 나이)의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성이 나타난 후에 치료를 시작할 것. 2) 임상검사치에의 영향: 때때로 기억적인 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 체망시 범혈구(전체 혈구) 감소증 및 간효소치 이상을 유발할 수 있다. 3) 프리지간탈이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다. 4) 과광투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법)(위세력) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광(방화)의 피해 방지에 건강한 곳(건조하고 시원한 곳에)에 올바른 보관할 것. 3) 오·남용(오용·잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【제조의뢰자】 조아제약(주)

본사: 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 공장: 경상남도 함안군 함안읍 광정로 318 인터넷 홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【제조자】 (주)조아파비스제약경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

※ 의약품을 어린이의 손에 놓지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

알벤다졸(USP) 400 mg

첨가제(티트리색소): 황색 5호

【효능 및 효과】 회충, 요충, 심이지장증, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합 감염의 치료

【성상】 연한 주황색의 장방형 필름코팅정제

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

※ 만약 구입시 사용 기한이 경과 되었거나 변질

변화, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국

에서 교환하여 드립니다.



D 010806460723

Rev. 0

1정 복용으로 간편한 온가족 구충제

2정

씹어서 복용하셔도
좋습니다.

온다졸®
(알벤다졸)

조아제약(주)

일반의약품
분류번호: 642

