

효과빠른 종합 소화제

베아로제(정)

KGMP적격업체 / 일반의약품 / 분류번호 233

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 : 1정(491.58mg) 중

판크레아틴(KP) ----- 175.0mg 셀룰라제(KP) ----- 50.0mg

우담즙건조엑스(생규) ----- 25.0mg 디메티콘(NF) ----- 25.0mg

첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호

기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트200731

성상 : 연녹색의 장방형 장용성 필름코팅정

효능 · 효과 : 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부 팽만감

용법 · 용량 : 만 15세 이상 : 1회 2정 1일 3회 식후에 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항.

정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 10정

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(043)881-6333로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조 하세요.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조의뢰자 : 한솔신약(주) 충북 음성군 금왕읍 청평길 2-11

제조자: (주)바스칸바이오제약 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

판매원 : 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

첨부문서 개정 년월일 : 2020. 06. 10