일반의약품	분류번호:114

[성상] 백색의 장방형 필름코팅정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

이부프로펜(약전) ····· 400mg

[용법 및 용량]

1. 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염
   : 성인 이부프로펜으로서 1회 200 ~ 600mg, 1일 3 ~ 4회 경구투여한다.
   1일 최고 3200mg까지 투여할 수 있다.
2. 연소성 류마티양 관절염 : 1일 체중 kg당 30 ~ 40mg을 3 ~ 4회 분할 경구투여한다.
3. 경증 및 중등도의 동통, 감기 : 성인 1회 200 ~ 400mg 1일 3 ~ 4회 경구투여한다.
   — 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
4. 어린이는 다음 1회 용량을 1일 3 ~ 4회 경구투여한다. 체중이 30kg미만인 어린이는 1일량이 500mg을 초과해서는 안되며 공복시 투여는 피하는 것이 바람직하다.
   어린이 1회 용량 - 11 ~ 14세 : 200 ~ 250mg 7 ~ 10세 : 150 ~ 200mg
   3 ~ 6세 : 100 ~ 150mg 1 ~ 2세 : 50 ~ 100mg

[효능 및 효과]

1. 주효능 · 효과 :
   류마티양 관절염, 연소성류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 감기로 인한 발열 및 동통, 요통, 월경곤란증, 수술후 동통
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.
   강직성 척추염, 두통, 치통, 근육통, 신경통, 급성통풍, 건선성 관절염, 연조직손상(염좌, 좌상), 비관절 류마티스질환(건염, 건초염, 활액낭염)

[주의 - 부작용]

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관

개정 : 97. 4. (Rev. 1)

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :

서울:서울특별시 영등포구 문래동 3가 54-65
공장:경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr

8 806052 170423