

일반의약품 분류번호:642

**[8량·8량]**

1 성인 및 24이상의 유·소아  
 II 호중 모중 심이저장증, 만성 이더라카 구충 : 400mg을 1회 복용한다. 24이상의 유·소아의 호중모는 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있다. 각 부선종 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다. 3) 만성적 중증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.  
 \*참거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사와 동시하거나 식사후 쓰는 것이 특별한 과장은 필요없다.  
 \*치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자 2) 임부 3) 2차 미만의 영아 4) 이 약을 유방을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 티오몰린, 티오몰린의 대체를 약제할 수 있다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것. 이 약이 코우모 이형의 난자에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용 시에는 수유를 중단하는 것이 좋다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 혈부에서 소지할 것. 1) 피부점막인종후근스다스-조스중후근, 다혈종반이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역 구토, 속쓰린 설사, 상복부 또는 복부 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발진, 가려움, 두드러기 등이 나타났는 보고가 있다. 4) 가역적인 담도증이 나타날 수 있다. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 기임중량의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성이 나타난 후에 치료를 시작할 것. 2) 임신중지시제의 영향 : 때때로 가역적인 부활구

수의 감소를 유발할 수 있고 과도한 처방시 방법 구 감소를 및 칸호소치 이상을 유발 할 수 있다. 3) 프리지반법이 일반다중 용성다시제의 활성성분을 증가시킨다는 보고가 있다. 4) 과량투여 했을 경우 대증요법우처제 및 일반적적인 지지 요법을 사용한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하여 건망한 곳에 실은 보관할 것. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것. **[저장방법]** 밀폐용기 실온(15~30℃)보관

작성일자 : 2010.02.10

- \* 본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 유통기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 모순된 제품은 구입한 약국, 약사 및 약학점 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
- \* 본 제품에 대한 변경된 내용은 홈페이지 ([www.c-tri.co.kr](http://www.c-tri.co.kr))p3.asp 및 고객센터(080-558-7575)에서 확인하실 수 있습니다.

제조사 :

**대웅제약**  
 경기도 화성시 향남읍 삼신리 306-10

제조업자 :

**주식회사 씨트리**  
 경기도 남양주시 일패로 775-1

일반의약품  
 분류번호:642


2정

알벤다졸 정 1회요법 구충제  
 8 206473 007513

알벤다졸 정 1회요법 구충제

**1회요법**  
 구충제

온가족 구충제  
**알벤다졸 정**



**[원료약품 및 그분량]** 정 중  
 알벤다졸(LP) 400mg  
 [성 성] 타민형의 흰색 4 정 105정  
 [효능 효과] 호중 모중 심이저장증, 만성 이더라카 구충, 만성적의 감염 및 이도 8량구충제의 지는

\* 사용 전에 케이스 외부에 표시된 내용을 주의깊게 읽은 후 사용하고, 사용후 약이 남은 경우에는 케이스에 넣어서 보관하십시오.

4010388