

# 덴파사

**[제품명] 덴파사캡슐**

Denpasa Capsule

**[성분·함량]** 이 약 1캡슐 중

염화리소짐(KPC)	30mg
카르바조크롬(KPC)	2mg
초산토코페롤50%(KPC)	10mg
아스코르빈산(KP)	150mg

**[성상]** 연분홍색의 분말이 든 상부 초록색, 하부 연두색의 경질캡슐입니다.

**[효능·효과]** 치은염·치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적·부기·출혈·통증)의 완화

**[용법·용량]** 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부:스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**[포장단위]** 120캡슐, 240캡슐

■ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

**[최신정보 확인 방법]**

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.donga.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.



본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252  
 공장 : 충청남도 천안시 차암동 404

DPS-7G001  
 작성년월일 : 2007. 7

\* 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다. [문의전화] 02-920-8261, 080-920-2002(수신자부담)