

기모타민정

항염증성 소염·효소제

10정

일반의약품

■ **원료약품 및 분량** : 1정중

브로멜라민(KPC) 40mg

결정트립신(SUP) 1mg

■ **성상** : 연녹색의 원형 장용성필름코팅정

■ **효능·효과** : 다음 질환 및 증상의 염증성 부종의 완화 : 수술 및 외상후, 유두종출

■ **용법·용량** : 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.

의약품분류번호 : 395

체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈액응고이상 환자

2) 심한 간장애 또는 신장애 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 삼십시 가능한 한 이첨부문서를 소지할 것.

1) 과민반응 : 발진, 발적 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 정해진 용법·용량을 지킬 것.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

※ 본 제품은 우수약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

KMTT 2008-02

(주) 한국파비스비이오텍

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3
 소비자상담실 031) 491-7178



분리배출



8 806110 104872