전문의약품

위염 · 위궤양 치료제

뮤코트라®정

(레바미피드 100mg)

【작용 · 특징】

1.뮤코트라정은 위내 염증 억제형 방어인자 증강제입니다

2.뮤코트라정은 H.pylori, 위산, NSAIDs등 각종 약물 및 stress등의 공격인자로 인한 위점막의 손상에 대하여 위내 방어인자를 증강시켜 위염을 억제합니다.

3.뮤코트라정은 위점막에서 Prostaglandin의 생합성을 증가시켜 위액으로 인한 위점막의 손상을 억제합니다.

4.뮤코트라정은 염증성 Cytokine의 생성을 감소시켜 염증반응을 개선시킵니다.

5.뮤코트라정은 Hydroxyl radical •OH의 소거작용으로 다형백 백혈구의 Superoxide 생산을 억제하여 위점막의 손상을 방어합니다.

6.뮤코트라정은 혈중이행도가 낮아 전신부작용 및 약물상호작용이 거의 없어 안전하게 사용할 수 있습니다.

【성분 · 함량】 - 1정중 -

레바미피드(식약청고시2002-34호) ·····100mg

【성　　상】 백색의 원형 필름 코팅정입니다.

【효능 · 효과】

1.위궤양

2.다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선:급성위염, 만성위염의 급성악화기

【용법 · 용량】

1.위궤양:성인 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구 투여합니다.

2.다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적,부종)의 개선:급성위염, 만성위염의 급성악화기 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 경구 투여합니다.

【사용상의 주의사항】

1.다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

이 약 성분에 과민증 병력 환자분

2.부작용

여기서 '드물게'는 0.1% 미만을, '때때로'는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미 합니다.

1)중대한 부작용

- 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명): 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오
- 간기능 장애(드물게), 황달(빈도불명): AST,ALT, 감마GPT, ALP상승 등을 수반하는 간기능 장애, 황달이 나타날수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

2)기타부작용

- 과민증:드물게 발진, 소양감, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날수있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지 하십시오.
- 정신신경계:마비, 어지러움,졸음이 나타날수 있습니다.
- 소화기:구갈,드물게 변비,복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통,트림, 미각이상 등이 나타날수 있습니다.
- 혈　액:때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구감소 등이 나타날수 있습니다.
- 기　타:유선부종,유선종창,유방통,여성형 유방,유즙분비 유발,월경이상, 심계항진, 발열, 안면홍조,혀의마비,숨가쁨 또는 드물게BUN 상승,부종, 인두부 이물감 등이 나타날수 있습니다

3.임부 및 수유부에 대한 투여

1)임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

2)동물실험에서 모유 중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피하십시오

4.소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

5.고령자에 대한 투여

고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 부작용에 주의하십시오.

6.취급상의 주의사항

1)소아의 손이 닿지않는곳에 보관 하십시오.

2)직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 뚜껑을 꼭 닫고 보관 하십시오.

3)다른용기에 넣을경우의약품 오용에의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될수 있으므로 반드시 원래의 용기에 보관 하십시오.

【저장방법】 차광 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관하십시오.

【포장단위】 자사포장단위

【사용기한】 제조일로부터 36개월 입니다.(외부에 표시된 사용기한 일자를 참조하십시오.)

※ 본의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정 중 변질, 변패 등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 소비자 보호법에 의한 피해보상규정(재정 경제부 고시 제 1996-3호)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불해 드립니다.

■ 제품 문의전화:(02)550-8329

■ 지역별 대웅제약 소비자 보호센터

· 서울 : 02)550-8308~9 · 부산 : 051)466-6725~8

· 광주 : 062)263-7511~3 · 대구 : 053)767-5581~3

· 대전 : 042)623-3356~8

주식회사 대웅제약
경기도 화성시 향남면 상신리 906-10

설명서 작성년월일 : 2003. 06. 04
설명서 개정년월일 :

제품의 사용기한은 외부 용기에 표시

http://www.daewoong.co.kr