전문의약품
분류번호114

COX-2 선택성이 높은 소염 · 진통제

아 크 로 정

(아세클로페낙)

ACRO Tablets.

아크로 정 은 아세클로페낙을 주성분으로 하는 골관절염, 류마티스 관절염 및 각종 염증성통증질환에 사용할 수 있는 진통 · 소염제로서 COX-2 에 대한 선택성이 높아 염증부위에서의 효과는 강한 반면 위점막에서의 Prostaglandin 차단 작용은 둔화시켜 위장장애 등의 문제는 개선하였습니다. 또한 생체 이용율이 높고 통증 및 염증부위에 약물 침투가 빠르므로 항염, 진통 효과가 우수하며 긴 작용 발현시간으로 1일 2회 투여로도 충분한 효과를 발휘하므로 복용이 간편합니다.

■원료의약품 분량 : 1정 중

아세클로페낙(E.P) ····· 100mg

■성 상

백색의 원형 필름코팅 정제

■효능 · 효과

류마티스양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측절개 수술후, 분만후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증

■용법 · 용량

통상 성인의 경우 1회 1정, 1일 2회(12시간마다) 복용합니다.
단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있습니다.
반드시 정제는 씹어먹지 않도록 합니다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세 잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 본 제제 또는 같은 계열의 일부약물(디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자
2) 다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식환자
3) 활동성 위 · 십이지장 궤양이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 위장관의 질병이나 과거 위궤양 경험이 있는 환자
2) 심한 간경변, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자
3) 이뇨제를 복용중인 환자
4) 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자
5) 고령자

4. 부작용

일시적으로 경미한 위복부 통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의
현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피하십시오.

6. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나 환자가 다른 약물 특히 리튬이나 디곡신(digoxin), 항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의하도록 하십시오.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
1) 임산부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
2) 6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않습니다.

8. 과량투여시의 처치
과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나, 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야하며, 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 하십시오.

■ 저장방법
기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

■ 포장단위
10, 100, 500, 1000 정

■ 사용기한
외부포장을 참조하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성년월일 2003.12.01

제조발매원
理研 이연제약주식회사
본사:서울 · 용산구 동빙고동 38-6
공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557, 5374