

세푸로틸 정

Cefuroxime Axetil

(세푸록심악세틸)

Cefurotil Tab.

분류번호:618

■ 원료약품의 분량 (1정 중)

세푸록심악세틸(항기) ----- 300.72mg(역가)
(세푸록심으로서 250mg)

■ 성 상 : 이 약은 백색-유백색의 장방형 필름코팅정제이다.

■ 효능 · 효과

1. 유효균종

1) 호기성 그람양성균

황색포도구균(페니실리나제 생성균 포함, 메치실린 내성균 제외), 표피포도구균(페니실리나제 생성균 포함, 메치실린 내성균 제외), 폐렴연쇄구균 및 베타 용혈성 연쇄구균, 스트렙토코쿠스아갈락티에(그룹B), 프로피오니박테룸

2) 호기성 그람음성균

대장균, 클레브시엘라, 프로테우스미라빌리스, 프로비덴시아, 프로비덴시아레 트게리, 인플루엔자균(암피실린내성균 포함), 모락셀라카타랄리스, 파라인플루 엔자균, 임균(페니실리나제 및 비페니실리나제 생성균 포함)

3) 혐기성균

그람양성 및 음성구균(펩토구균 및 펩토연쇄구균 포함), 그람양성간균(클로스 트리듐 포함), 그람음성간균(박테로이드 및 방추균 포함)

2. 적응증

세푸록심은 베타락타마제에 매우 안정하며 대부분의 암피실린 및 아목시실린 내성 균주에 대하여도 효과를 나타내는 광범위 살균성 세팔로스포린계 항생물 질이다.

- 상기도 감염증 : 중이염, 부비동염, 편도염, 인두염 등

- 하기도 감염증 : 급·만성기관지염, 폐렴 등

- 비뇨생식기계 감염증 : 신우신염, 방광염, 요도염 등

- 피부 및 연조직감염증 : 종기증, 농피증, 농가진 등

- 임질 : 단순급성임균성요도염, 임균성자궁경관염

■ 용법 · 용량

최적의 흡수를 위하여 식후에 복용해야 한다.

• 성인 및 12세 이상의 소아

대부분의 감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다. 중증 하기도 감 염증 또는 폐렴이나 중증의 감염증, 저 감수성균에 의한 감염증이 의심될 때는 1일 2회, 1회 500mg을 투여한다. 요로감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 125mg이며 신우신염이나 증상에 따라 용량은 1일 2회, 1회 250mg으로 할 수 있다. 단순임질의 경우 1g을 1회 투여한다.

• 유아 및 12세 미만의 소아

대부분의 감염증에는 1회 125mg을 1일 2회 투여한다. 단, 2세 이상의 중이염 환자에게는 1회 250mg을 1일 2회 투여한다. 3개월 미만의 영아에 대해서는 사 용된 경험이 부족하다. 스트렙토코쿠스피오게네스(그룹A-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에 있어서는 7~10일간 이 약을 투여해야 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

세팔로스포린계 항생물질에 과민반응 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 페니실린계 또는 다른 베타락탐계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 본인 또는 부모, 형제에 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자

3) 중증의 신장장애 환자

4) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환 자(비타민 K 결핍 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 이상반응

1) 속 : 드물게 속 증상을 일으키는 경우가 있으므로 세밀히 관찰해야 하며, 불 쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등의 증상이 나타나는 경 우에는 투여를 중지해야 한다.

2) 과민반응 : 안면부종, 림프선종창, 관절통, 혈청병양 반응, 때때로 발진, 드 물게 두드러기, 가려움, 발열 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여중지와 같은 적절한 처치를 한다.

3) 소화기계 : 드물게 발열, 복통, 백혈구 증다, 점액, 혈액변을 수반하는 중증 의 설사를 주증상으로 하는 대장염으로서, 내시경 검사시 위막반 등의 형성이 보이는 위막성 대장염이 드물게 나타나는 경우가 있다. 복통, 빈번한 설사가 나 타날 때는 즉시 투여중지와 같은 적절한 조치를 취해야 한다. 때때로 복통, 설 사, 구역, 구토, 소화불량, 변비, 식욕부진 드물게 복부팽만감 등이 나타나는 경우가 있다.

4) 호흡기계 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X-선이상, 호산구 증다 등을 수반한 간질성 폐렴, 호산구성 폐렴이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나 타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여하는 등 적절한 처치를 한 다.

- 5)혈액계 : 때때로 호산구 증다, 과립구 감소, 백혈구 감소, 드물게 적혈구, 헤모글로빈, 헤마토크리트, 혈소판의 감소, 용혈성 빈혈 등이 나타나는 경우가 있다. 또한 다른 세뎀계 항생물질(세팔로틴나트륨, 세팔로리딘 등)에 의해 용혈성 빈혈이 나타난 경우가 보고된 바 있다.
- 6)중추신경계 : 경련, 때때로 두통이 나타날 수 있다. 특히 고령이거나 고열 또는 중증감염이 동반 되었을 때 불안, 초조, 정신착란, 환상이 나타날 수 있다.
- 7)피부 : 드물게 다형홍반, 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사용해가 나타날 수 있다.
- 8)간장 : 때때로 ALT, AST, LDH 등의 간효소 수치에 일시적인 상승, 드물게 황달, 간염이 나타난 경우가 있다.
- 9)신장 : 가끔 BUN 등의 상승이 나타난 경우가 있고, 급성 신부전 등의 중증의 신장장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 10)균과대증 : 드물게 칸디다증이 나타나는 경우가 있다.
- 11)비타민 결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타나는 경우가 있다.
- 12)기타 : 드물게 이통, 입주위감각이상, 혀의 마비감, 인두이상감, 구내건조, 심계항진, 습진이 나타나는 경우가 있다. Lyme병 환자에 투여시에는 아리시헤릭스하이머 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1)이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2)속 등의 반응을 예측할 수 있도록 충분히 문진해야 한다.
- 3)다른 항생물질과 마찬가지로 이 약을 장기간 투여하면 비감수성균(칸디다, 장내구균, 클로스트리듐 디피셀)의 과잉성장이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 치료를 중단해야 한다.

5. 상호작용

- 1)푸로세미드 등의 이뇨제나 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여시 신장장애가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 2)프로베네시드와 병용투여시 이 약의 세뇨관 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있다.
- 3)제산제 등 위산 억제제와 병용시 효과가 감소되므로 식사와 함께 복용하는 것이 흡수에 좋다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1)임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2)이 약은 모유로 이행되므로 수유부에 투여 시는 주의해야 한다.

7. 소아에 대한 투여

- 1)3개월 미만의 영아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
- 2)정제를 깨서 먹을 경우 매우 쓴 맛이 나므로 소아에 투여시에는 건조시럽제가 추천된다.

8. 고령자에 대한 투여

- 고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.
- 1)일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발현하기 쉽다.
 - 2)비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있다.

9. 임상검사치에의 영향

- 1)베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 2)직접 쿼스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 이 현상은 혈액의 교차시험에 영향을 미칠 수 있다.
- 3)혈당 검사를 시행할 때에는 페리시아나이드 검사에 의해 위음성이 나올 수 있으므로 글루코스옥시데이즈나 헥소카이나제 방법에 의해 측정한다.

10. 과량투여시의 처치

세팔로스포린계 약물의 과량투여는 경련을 야기하는 뇌자극을 일으킬 수 있다. 세푸록심의 혈청농도는 혈액투석이나 복막투석으로 감소될 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2)본 제품을 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 포장단위 : 10, 60정

■ 저장방법 및 유효기간 : 밀폐용기, 25°C 이하보관, 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정 : SD-2006-09-14

* 이 첨부문서 작성일자(2006년 09월 14일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.



제조 및 판매원
삼천당제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 904-1

대표전화 : (02)2679-0146, <http://www.scd.co.kr>