

* 2002년 7월 1일 이후부터 제조를 책임범이 시행되고 있습니다.
의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다.
 2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.
 3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
 4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
 5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- * 소비자 상담전화 : 080-022-2200

[전문약품]

Treatment for gastritis & gastric ulcer
국제 레바미피드정
(레바미피드)

국제레바미피드정은 위점막의 염증 및 궤양을 일으키는 활성 산소를 제거하고 *H.pylori* 또는 NSAID에 의한 염증성 cytokine의 생합성을 감소시켜 염증 및 궤양 발생을 억제합니다. 뿐만 아니라 위점막에서 prostaglandin의 생합성을 증가시켜 위점막을 보호하고 손상된 위점막이 빠르게 치유될 수 있도록 하는 궤양 치료제입니다. 국제레바미피드정은 위점막에서의 염증 및 궤양 발생 억제 작용과 손상된 위점막 치유 작용을 동시에 함으로써 궤양 치유의 질을 높인 위점막 보호제입니다.

[성분·함량] 이 약 1정 중,
레바미피드(별규) 100mg

[성상] 백색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

[용법·용량]

1. 위궤양 : 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구 투여 합니다.
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 - 급성위염, 만성위염의 급성악화기 : 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 경구 투여 합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약 성분에 과민증 병력 환자
2. 부작용
여기서 "드물게"는 0.1% 미만을, "때때로"는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미합니다.
1) 중대한 부작용
(1) 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명)
백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
(2) 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명)
AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
2) 기타 부작용
(1) 과민증
드물게 발진, 기려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지합니다.
(2) 정신신경계
마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다.
(3) 소화기
구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다.
(4) 혈액
때때로 백혈구 분획증, 보법핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있습니다.
(5) 기타
유산 부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유증분비, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨, 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있습니다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피합니다.
4. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다.)
5. 고령자에 대한 투여
고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 부작용에 주의합니다.

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

[사용기간] 36개월

[포장단위] 100, 500정

- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.
- * 유효기간·사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 분사 영입부(TEL 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 분사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
<http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사랑입니다.



제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

2006. 7. 20

작성일 : 2005년 2월 21일