

새로운 위염·위궤양 치료제

레파드린 정

(REPADRINE Tab.)

원료약품 및 그 분량 : 1정(180mg)중

레바미피드(KPC).....100.0mg

성상 백색의 원형 필름코팅정

효능·효과

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

용법·용량

1. 위궤양 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침 전에 경구투여합니다.
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선:급성위염, 만성위염의 급성악화기 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 경구 투여합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
이 약 성분에 과민증 병력 환자
2. 부작용
여기서 '드물게'는 0.1%미만을, '때때로'는 0.1-5%미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미합니다.
 - 1) 중대한 부작용
 - ① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - ② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 2) 기타 부작용
 - ① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로

- 로 이와 같은 경우에는 투여를 중지합니다.
- ② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다.
 - ③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다.
 - ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 기타 : 유선 부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨, 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있습니다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피합니다.
4. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)
5. 고령자에 대한 투여
고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 부작용에 주의합니다.

저장방법 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
 ※ 본 의약품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

고객문의
 주소 : 서울시 서초구 양재2동 324-1
 전화 : 02)2057-9980(대)

K G M P 전문의약품
 우수약품제조업체 분류번호 : 232

제조·판매원 www.boramph.co.kr
Boram 보람제약주식회사
 경기도 안산시 단원구 목내동 471 Tel. (031)493-0077

060905