

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



위염 · 위궤양 치료제

전문의약품

분류번호: 232

바리드 (정) (레바미피드)

[특장점]

1. 바리드 정은 위내염증 억제형 방어인자 증강제입니다.
2. 바리드 정은 H·Pylori, 위산, NSAIDs 등 각종 약물 및 Stress 등의 공격인자로 인한 위점막의 손상에 대하여 위내 방어인자를 증강시켜 위염을 억제합니다.
3. 바리드 정은 위점막에서 Prostaglandin의 생합성을 증가시켜 위액으로 인한 위점막의 손상을 억제합니다.
4. 바리드 정은 염증성 Cytokine의 생성을 감소시켜 염증반응을 개선시킵니다.
5. 바리드 정은 Hydroxy radical OH의 소거 작용으로 다형백 백혈구의 Superoxide 생산을 억제하여 위점막의 손상을 방어합니다.
6. 바리드 정은 혈중 이행도가 낮아 전신부작용 및 약물 상호 작용이 거의 없어 안전하게 사용할 수 있습니다.

[성분 · 함량] 1정증

주성분 : 레바미피드(식약청고시 제2002-34호) 100mg

[성상] 백색의 원형필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기
※ 다른 용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

[용법 · 용량]

1. 위궤양 : 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여한다.
2. 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성 위염의 급성악화기
보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100mg)을 1일 3회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약 성분에 과민증 병력 환자

2. 부작용

여기서 '드물게'는 0.1% 미만을, '때때로'는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도불명을 의미함

1) 중대한 부작용

① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.



삼남제약주식회사

KGMP공장 : 충남 금산군 금산읍 상리99-1

소비자상담창구 : 041-754-3771

2) 기타 부작용

- ① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
- ② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있다.
- ③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
- ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있다.
- ⑤ 기타 : 유선 부종, 유선 종창, 유방통, 유성형 유방, 유즙분비 유발, 월경이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.

3. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다.)

5. 고령자에 대한 투여

고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상등의 부작용에 주의한다.

[저장방법] 차광·밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 의약품을 원래 용기에 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[사용기한] 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

[포장단위] 자사포장단위

* 만약 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국, 병원개설자에 한하여 교환해 드립니다.

개정일자 : 051222

* 이 첨부문서 2005년 12월 22일 이후 변경된 내용은 www.samnam51.com이나 041-754-3771에서 확인할 수 있음.