

# 치옥탄 에이치알 정

(치옥트산)

**【원료약품의 분량】** : 1정 중

치옥트산(식약청고시) ..... 600.00mg

**【성 상】** 녹색의 장방형 필름코팅정

**【효능·효과】** 당뇨병성 다발성 신경염의 완화

**【용법·용량】**

성인 1일 1회 치옥트산으로서 600밀리그램을 충분한 물과 함께 아침식사 약 30분 전에 복용한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말것
  - 1) α-lipoic acid 또는 기타 부형제에 대하여 과민증이 있는 환자
  - 2) 이약은 소아 및 청소년을 대상으로 한 임상적 경험이 없으므로 투여하지 않는다.
2. 부작용
  - 1) 소화기계 : 드물게 오심, 구토, 위장관계 통증, 설사등이 나타날 수 있다.
  - 2) 피부 부 : 드물게 피부발진, 두드러기, 가려움등의 알러지 반응이 나타날 수 있다.
  - 3) 드물게 포도당 이용율 증가에 의해 혈당치가 떨어지는 경우가 있다. 이러한 경우, 어지러움, 발한, 두통, 시력 장애와 같은 저혈당증 유사증상이 나타날 수 있다.
  - 4) 드물게 미각 장애가 보고되었다.
3. 일반적 주의
 

알콜의 상습적인 복용은 신경병적 임상 증상의 발생과 진전에 중대한 위험인자로 관찰되었으므로 이 약의 치료 효과를 방해할 수 있다. 따라서 당뇨병성 다발성신경병증 환자는 가능한 한 알콜 섭취를 피해야 하며 이것은 휴약 기간에도 적용된다.
4. 상호작용
  - 1) 이약과 동시투여로 인해 cisplatin 의 효과가 경감될수 있다.
  - 2) α-lipoic acid는 금속화합물(철, 마그네슘을 포함하는 제제, 우유(칼슘함유등)과 동시에 복용했을 때 체내에서 불용성 착체를 형성하므로 동시 복용하지 않는다. 만약, 이약을 아침식사 30분 전에 복용하였다면, 철과 마그네슘제제는 점심이나 저녁에 복용한다.
  - 3) 이 약과 동시 투여로 인해 인슐린이나 다른 경구 당뇨병약의 혈당 감소 작용이 증감될 수 있으므로 이와 같은 경우 특히 치료 초기에 혈당치에 대한 규칙적인 monitoring이 추천된다. 저혈당증을 피하기 위하여 인슐린이나 경구용 당뇨병약의 투여량을 줄여야 할 경우도 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 생식 독성 연구 결과 수정률이나 초기 태아 발달에 이 약이 영향을 끼친다는 증거는 없었으며, 태아 독성도 불명확한다.
  - 2) α-lipoic acid가 모유중으로 분비되는지에 대해선 알려진 바 없다.
  - 3) 임부 및 수유부에 대해서는 약물의 유익성과 위험성을 평가한 후 투여해야 하며, 의사가 긴급히 처방한 경우에 사용한다.
6. 과량투여시의 처치
 

α-lipoic acid로 10~40그램에 해당하는 양을 알콜과 함께 경구 복용한 후 때때로 치사 상태를 유발하는 심각한 중독 증상이 관찰된 바 있다. 중독의 임상증상은 초기에 정신운동성 불안 혹은 의식불명으로 나타나며, 더 심한 경우, 전신 발작과 유산 산증이 전형적으로 나타난다. 저혈당증, 쇼크, 횡문근변성, 용혈, 산재성 혈관내 응고(DIC), 골수억제, 다기관 부전이 α-lipoic acid의 고용량 중독으로 나타났다. 이 약으로 인한 중독(성인의 경우 600밀리그램 10정 이상, 소아의 경우 체중 킬로그램당 50밀리그램 이상)이 조금이라도 의심스러운 경우, 즉시 입원하여 일반적인 중독치료를 실시해야 한다.(구토유도, 위장 관주요법, 활성탄 투여등) 전신발작, 유산산증 등 치사적인 중독 상태의 치료시엔 현대에 중점적으로 이루어지는 치료 원리에 따라 증상 치료를 해야한다. 현재 α-lipoic acid의 배설을 촉진하기 위한 혈액투석, 혈액관류 혹은 여과 기술에 대한 유익성은 확립되지 않았다.
7. 저장상의 주의사항
 

30°C이상에서는 저장하지 않는다.

**【포장 단위】**

자사 포장단위

**【저장 방법】**

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

**【사용 기간】**

제조일로부터 36개월

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

\* 고객 상담실 : 080-221-2000(수신자 부담)

작성년월일 : 2006. 5

제조발매원

**이연제약주식회사**

본사:서울·용산구 동빙고동 38-6

공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

TEL. (02)793-5557,5374