

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

amoxicillin/clavulanate

2. 약품

오구멘틴정

(아목시실린/클라불란산칼륨)

3. 효능

(페니실린계 항생제)

항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약

4. 주의사항

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

E06 (발진이 생기면 전문가에게 알려주세요)

5. 복약안내

복용법, 복용기간을 환자 임의로 변경하는 경우, 항생제에 내성이 생겨 감염이 재발할 수 있으므로 지시한 용법을 지킵니다.

구역, 속쓰림 등의 증상이 나타나면 음식과 함께 복용합니다.

지속적으로 설사를 할 경우 의사나 약사와 상담합니다.

음주에 의해 부작용이 과도해 질 수 있으므로 피합니다.

알러지 반응(가려움증, 얼굴과 손의 부종, 숨참, 흉통)이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되지만 아기에게 위험성이 적어 약물 복용 시 수유가 가능합니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.