

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

ciprofloxacin

2. 약품

씨록정

(시프로플록사신)

3. 효능

(퀴놀론계 항생제)

항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약

4. 주의사항

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I05 (카페인 • 알코올 X)

I01 (유제품 X)

P03 (자외선을 피하세요)

5. 복약안내

복용법, 복용기간을 환자 임의로 변경하는 경우, 항생제에 내성이 생겨 감염이 재발할 수 있으므로 지시한 용법을 지킵니다.

구역, 속쓰림 등의 증상이 나타나면 음식과 함께 복용합니다.

약물의 부작용이 증가할 수 있으므로 카페인과 알코올의 섭취를 줄입니다.

제산제, 유제품, 칼슘, 철분에 의해 이 약의 흡수가 감소하므로 이 약 투여 1~2시간 전 또는 4시간 후에 복용합니다.

햇빛에 민감해 질 수 있으므로 햇빛을 피하거나 선크림, 모자 등을 사용하여 피부를 보호합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C입니다. FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유익성이 잠재적 위험정보보다 클 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.