

## 임부/수유부를 위한 복약안내

### 1. 성분명

famotidine

### 2. 약품

가스터정

(파모티딘)

### 3. 효능

(소화성궤양용제)

위산분비를 줄임으로써 위장관 질환을 치료하는 약

### 4. 주의사항

C04 (졸릴수 있어요)

I04 (카페인 X)

I06 (흡연·알코올 X)

E06 (발진이 생기면 전문가에게 알려주세요)

### 5. 복약안내

구강내봉해정의 경우 혀 위에 두고 녹여서 복용할 수 있습니다.

졸음이 나타날 수 있으므로 운전이나 위험한 기계조작을 피합니다.

두통, 어지러움이 나타날 수 있으며 혼동이 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.

커피, 알코올, 흡연에 의해 위산분비가 증가할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

설사, 변비가 나타날 수 있으며 신생아가 사용할 경우 괴사성 장염이 나타날 수 있습니다.

### 6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권

장하지 않습니다.

## **7. 공통사항**

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.