

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

glimепiride

2. 약품

그리메피드정
(글리메피리드)

3. 효능

(혈당강하제)

인슐린 분비를 촉진시켜 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

D13 (식전에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

I03 (알코올 X)

E06 (발진이 생기면 전문가에게 알려주세요)

5. 복약안내

식전에 복용합니다.

졸음이나 어지러움, 두통이 나타날 수 있으므로 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

술은 혈당강하 효과를 증강시켜 저혈당성 혼수상태를 일으킬 수 있으므로 피합니다.

급작스런 허기, 현기증, 떨림 등 저혈당 증상이 있을 시 사탕, 과일주스 등을 복용합니다.

설파계 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C입니다. FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유익성이 잠재적 위험정보보다 클 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.