

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

ibuprofen

2. 약품

대원이부프로펜정, 디퓨탭서방정, 스피드펜나노연질캡셀, 캐롤시럽, 삼일부루펜
좌제, 노팅겔
(이부프로펜)

3. 효능

(해열진통소염제)

비스테로이드성 소염진통제로 발열, 통증, 염증을 치료하는 약

4. 주의사항

D14 (식후에 복용하세요)

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I03 (알코올 X)

P12 (임신 • 임신 계획 시 먹지 마세요)

5. 복약안내

위장장애가 나타날 수 있으므로 음식과 함께 복용합니다.

음주에 의해 위장출혈이 발생할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

혈압을 상승시켜 항고혈압약제의 효과가 떨어질 수 있습니다.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 미리 알립니다.

드물지만 소변량 감소, 흑변, 알려지 반응(가려움증, 얼굴과 손의 부종, 숨참, 흉통)이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C(임신 3주기-D)입니다.
FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유
익성이 잠재적 위험성보다 클 때 사용할 수 있습니다. FDA-D의 경우 태아에
대한 위험성이 있는 약물로, 보다 안전한 약물의 사용이 불가능하거나 효과가

없을 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되며 아기에게 위험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.