

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

pioglitazone

2. 약품

액토스정

(피오글리타존)

3. 효능

(당뇨병용제)

인슐린의 이용률을 증가시켜 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

P17 (피임하세요)

I03 (알코올 X)

5. 복약안내

음식과 함께 또는 따로 복용할 수 있습니다.

다른 경구용 혈당강하제와 병용투여 시 저혈당(빈맥, 식은땀, 오심, 구토, 두통, 시각장애, 의식소실) 발현 가능성이 있어 주의가 필요합니다.

폐경 전, 무배란성 여성에게서 배란이 시작될 수 있어 임신가능성이 높아지므로 적절한 피임이 권장됩니다.

여성에게서 상완, 손, 발 등에 골절의 빈도가 증가될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

드물지만 심부전 증상, 시야흐림, 간기능 악화 증상, 혈뇨, 긴박뇨, 배뇨통 등이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 C입니다. FDA-C의 경우 태아에 대한 위험성을 배제할 수 없는 약물로, 약물 사용의 유익성이 잠재적 위험성보다 클 때 사용할 수 있습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위험

성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4 시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.