

임부/수유부를 위한 복약안내

1. 성분명

rabeprazole

2. 약품

파리에트정
(라베프라졸)

3. 효능

(소화성궤양용제)

위산분비를 억제함으로써 위장관 질환을 치료하는 약

4. 주의사항

D13 (식전에 복용하세요)

p01 (쫓개지 마세요)

I04 (카페인 X)

I06 (흡연 · 알코올 X)

5. 복약안내

식전에 복용하며, 씹거나 부수지 않고 물과 함께 그대로 삼킵니다.

두통, 졸림, 현기증이 나타날 수 있습니다.

설사, 변비, 구역, 구토, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다.

커피, 알코올, 흡연에 의해 위산분비가 증가할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

장기간 사용시 골절, 위축성 위염, 설사가 나타날 수 있으므로 주의깊게 관찰합니다.

6. 임부/수유부를 위한 안내

※ 임신 중 약물사용과 관련된 FDA 위험등급은 B입니다. FDA-B의 경우 태아에게 위험하다는 증거가 없는 약물입니다. 그러나 동물실험을 근거로 임부에서의 투여를 추천하지 않습니다.

※ 약물이 모유를 통해 분비되는지에 대해 알려진 바가 없으나 아기에게 위

험성을 배제할 수 없어 수유를 권장하지 않습니다.

7. 공통사항

임부가 약을 복용할 시 전문가의 판단에 따라 약물 복용의 이익이 위험성을 상회하는 경우 복용 가능합니다.

수유부가 약을 복용할 시 모유를 먹인 직후 약을 복용하고 다음 수유까지 3-4시간의 간격을 두는 것이 좋습니다.