



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

atorvastatin

2. 효능

(고지혈증 치료제)

콜레스테롤 생합성을 억제하여 고지혈증 치료 및 관상동맥 심장질환의 위험 감소를 위해 사용됩니다.

3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 1회 10~80mg, 1일 1회, 최대용량 1일 80mg

○ 소아(10-17세; 여아의 경우 초경 1년 후)

1) 1회 10~20mg, 1일 1회, 최대용량 1일 20mg

이 약을 투여하는 환자는 콜레스테롤 저하식을 하여야 하며, 하루 중 아무 때나 음식물과 상관없이 투약할 수 있습니다.

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다. (임부등급: FDA-X, 호주-D)

활동성 간질환 환자 또는 근질환환자는 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

근육통, 시각장애, 청력소실, 피부발진, 가려움

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 근육경련, 근육통, 근육병증: 원인불명의 근육통 또는 쇠약이 발생하면 의사나 약사에게 즉시 알립니다.

- 무력감, 피로: 무력감이나 피로가 오래 지속되면 의사나 약사와 상담합니다.
- 복부팽만, 소화불량, 구역, 구토: 소화기계에 불편감이 지속될 경우 의사나 약사에게 알립니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

제산제, 경구용 피임제, phenytoin, clarithromycin, ketoconazole, fibrate 계열 약물

○ 음식

자몽주스에 의해 약물의 효과나 부작용이 과도해 질 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

알코올을 과다복용하면 근육병증 유발가능성이 높아지므로 주의합니다.

고콜레스테롤 식이(계란 노른자, 동물의 간, 내장, 베이컨, 버터 오징어, 새우 등)를 하지 않도록 주의합니다.

7. 사용 시 주의사항

활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소치의 상승이 정상치의 3배 이상 상승된 환자 또는 근질환 환자에서는 이 약의 사용이 금기이므로 의사와 상의합니다.

신질환자, 갑상선 질환자에서도 횡문근융해증의 위험이 증가할 수 있으므로 의사와 상의합니다.

뇌출혈이 보고된 바 있는 일과성 뇌허혈증이나 뇌졸중환자에서는 주의하여 사용합니다.

8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.