



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

glimепiride

2. 효능

(혈당강하제)

췌장의 베타세포로부터 인슐린 분비를 촉진시키고 인슐린 감수성 증가, 간에서의 당신생 저하작용을 나타내어 제 2형 당뇨병 치료에 사용됩니다.

3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 제 2형 당뇨병: 1회 1-8mg, 1일 1회, 1일 최고용량 8mg

아침식사 전 또는 첫 번째 식사직전에 물 1/2컵 이상과 함께 씹지 않고 삼킵니다.

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물 및 다른 설폰 요소계 또는 설폰아미드계 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

간질환, 신질환, 갑상선 기능장애가 있는 경우 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

저혈당 증상, 알러지 반응

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 저혈당: 급작스런 허기, 현기증, 떨림, 졸음, 피로, 두통, 발한 등 저혈당 증상이 일어날 수 있습니다. 이 경우 즉시 혈당 검사를 시행함과 동시에 당질 15g 정도(예: 주스 1-2컵, 우유 1-2컵, 각설탕 2-3개, 사탕 3-4개 등)를 섭취한 후 15분간 휴식을 취합니다. 계속 저혈당 증상을 느끼면 다시 당질 15g 정

도나 간단한 음식(과자, 빵 등)을 섭취합니다. 그래도 계속적으로 혈당이 낮거나 저혈당 증상이 지속되면 즉시 의사나 약사에게 연락합니다.

- 피부 : 홍반, 홍역성 반구진성 발진, 두드러기, 가려움증, 습진 같은 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 대부분 경미한 증상이지만 드물게 호흡곤란, 혈압강하 등을 수반한 심각한 반응으로 이어질 수 있으니 발생 시 의사 또는 약사와 상의합니다.

- 광 과민반응: 햇빛에 민감해질 수 있으므로 햇빛을 피하거나 선크림, 모자 등을 사용하여 피부를 보호합니다.

- 눈: 혈당치 변화에 따라 일시적으로 시야흐림 등 시각적 이상이 나타날 수 있습니다.

- 어지러움: 운전이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

- 두통, 구역, 복통

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

베타 차단제, somatropin, fluconazole, rifampin

○ 음식

술은 혈당강하 효과를 증강시켜 저혈당성 혼수상태를 일으킬 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

7. 사용 시 주의사항

지연성 저혈당증을 일으킬 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 위험한 기계조작 시 주의합니다.

약물 복용 후에 식사를 거르지 않는 것이 매우 중요합니다.

8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.