



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

nebivolol

### 2. 효능

(혈압강하제)

심장에 선택적으로 작용하는 베타차단제로 심근수축력을 저하시켜 혈압저하 작용을 나타내며 고혈압, 만성 심부전의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 고혈압: 1회 5mg, 1일 1회, 최대용량 1일 40mg

○ 고령자

1) 고혈압(65세 이상): 1회 2.5-5mg, 1일 1회

2) 만성 심부전(70세 이상): 1회 1.25-10mg, 1일 1회

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

중증의 간장애, 신장애가 있는 경우 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

서맥, 심부전의 악화, 현기증, 무력증, 저혈압

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 서맥: 맥박이 50-55 이하로 감소하거나 무력감, 호흡곤란, 어지러움이 심한 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

- 저혈압: 어지러움, 현기증이 나타날 수 있으므로 앉거나 누웠다가 일어날 때 천천히 일어나며, 이러한 증상이 지속되는 경우 의사와 상의한 후 약을 감량하거나 중단합니다.

- 기관지 경련: 천식환자에서는 기도저항이 나타날 수 있으므로 의사와 상의한 후 기관지 확장제를 처방받도록 합니다.
- 저혈당 증상은폐: 저혈당 증상(특히 빈맥)이 은폐될 수 있으므로 당뇨병환자는 주의하여 사용합니다.

○ 다음과 같은 증상이 과량 투여 시 나타날 수 있습니다.  
저혈압, 서맥, 기관지 경련, 급성 심부전 및 저혈당

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

## 6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물  
amiodarone, verapamil, diltiazem, clonidine, flecainide, insulin

## 7. 사용 시 주의사항

혈압강하에 동반되는 일과성 쇼크증상이 나타날 수 있으므로 차가운 느낌, 구토, 의식소실 등 증상이 나타나는 경우에는 투약을 중단하고 적절한 처치를 합니다.

갑자기 복용을 중단하면 증상이 악화될 수 있으므로 의사와 상의 없이 투여를 중단하지 않습니다.

## 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

## 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

## 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.