



전문가를 위한 상세 복약안내

1. 성분명

pioglitazone

2. 효능

(당뇨병용제)

인슐린의 이용률을 증가시켜 인슐린 비의존성 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여합니다.

3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 1회 15mg, 1일 1회, 최대용량 1일 30mg

단, sulfonylurea 계열 약물이나 metformin과 2~3제 요법으로 병용 투여 시 기존 투여 약물의 상용량을 유지할 수 있으며, 저혈당 발현 시에는 sulfonylurea의 용량을 감량합니다. 또한 인슐린과 병용 시에도 인슐린 투여량을 지속적으로 유지할 수 있으나, 저혈당이 발현되거나 혈장 글루코스 농도가 100mg/dL 이하로 감소하게 되면 인슐린 투여량을 10%~25%까지 감량하게 됩니다.

음식과 함께 또는 따로 복용할 수 있습니다.

4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

심부전, 간질환, 신질환, 방광암, 빈혈, 갈락토즈 불내성이 있는 경우 미리 알립니다.

5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

울혈성 심부전의 증상(과도하고 급속한 체중변화, 호흡곤란, 부종 등), 황반 부종(흐린시야 또는 시력감소), 간기능 악화의 증상(특별한 이유가 없는 구역, 구

토, 복통, 피로, 식욕부진 등), 방광암의 증상(혈뇨, 긴박뇨, 배뇨통, 요통, 복통 등)

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 배란: 폐경 전, 무배란성 여성에게서 배란이 시작될 수 있어 약 복용 중 임신 가능성이 높아질 수 있으므로 적절한 피임이 권장됩니다.
- 저혈당: 다른 경구용 혈당강하제와 병용투여 시 저혈당(빈맥, 식은땀, 오심, 구토, 두통, 시각장애, 의식소실 등) 발현 가능성이 있어 주의가 필요합니다.
- 골절: 여성환자에서 상완, 손, 발 등에 골절의 빈도가 증가될 수 있어 주의가 필요합니다.
- 상기도 감염증, 두통, 빈혈: 상기도 감염증, 두통, 빈혈 등이 나타날 수 있습니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

gemfibrozil, rifampin, midazolam

○ 음식

음주에 의해 약물의 효과나 부작용이 과도해 질 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

7. 사용 시 주의사항

약물의 효과가 약 2주 후 서서히 시작되어 2~3달 후에야 안정화됩니다.

인슐린 비의존성 당뇨병의 치료는 식이 및 운동요법이 함께 병행되어야 합니다.

8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.