



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

rabeprazole

### 2. 효능

(소화성궤양용제)

프로톤펌프를 비가역적으로 억제하여 위산분비를 억제함으로써 위궤양, 십이지장궤양, 역류성 식도염 및 위식도역류질환의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

장용정

○ 성인

- 1) 위궤양, 십이지장궤양, 역류성 식도염 및 위식도역류질환: 1회 10-20mg, 1일 1회, 최대용량 1일 20mg
- 2) 졸링거엘리슨 증후군: 1회 60mg, 1일 1회, 최대용량 1일 120mg
- 3) Helicobacter pylori에 감염된 십이지장궤양의 재발방지를 위한 항생제 병용요법: 1회 20mg, 1일 2회, 7일간
- 4) 역류성 식도염의 재발방지: 1회 10-20mg, 1일 1회

이 약은 씹거나 부수지 않고 식전에 적어도 반컵 이상의 물과 함께 그대로 삼킵니다.

간장애 환자에서는 간성뇌증의 이상반응이 보고되었으므로 신중히 투여한다.

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약의 구성성분에 과민반응이 있거나 atazanavir를 복용하고 있는 환자는 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

중증의 간장애 환자는 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

설사, 황달, 발적, 두드러기, 흉통, 심계항진

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 두통, 졸림, 현기증, 불면증, 감각이상증이 나타날 수 있습니다.
- 위장관계: 설사, 변비, 구역, 구토, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다.
- 간기능: 간효소의 상승이 나타날 수 있으므로 간기능 검사를 받습니다.
- 피부: 발적, 두드러기, 가려움, 스티븐스존슨 증후군, 탈모 등이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타나는 경우는 투여를 중지합니다.
- 저마그네슘혈증: 디곡신, 이노제와 장기간 병용시 저마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 혈중 마그네슘 수치를 모니터링 해야합니다.
- 엉덩이, 손목, 척추골절: 장기간 사용시 뼈골절이 보고된 바 있으므로 저용량으로 단기간 사용할 것을 권장합니다. 칼슘과 비타민 D를 병용합니다.
- 위축성 위염, 세균성(clostridium difficile) 설사: 장기간, 고용량 복용시 위축성 위염 또는 세균성 설사가 나타날 수 있으므로 해당증상이 나타나는 경우 의사와 상의합니다.

○ 다음과 같은 증상이 과량 투여 시 나타날 수 있습니다.

착란, 흥분, 공격성, 환각, 우울

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

## 6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

atazanavir, clopidogrel, nelfinavir, diazepam, phenytoin, warfarin, voriconazole, clarithromycin

○ 음식

알콜 또는 음식의 영향을 받지 않습니다.

## 7. 사용 시 주의사항

씹거나 부수지 말고 그대로 복용합니다.

약성종양의 가능성이 있는 위궤양 환자에서 이 약을 사용 시 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 반드시 양성환자에게만 투여합니다.

이 약을 포함한 프로톤 펌프 저해제들은 아타자나비어, 클로피도그렐, 넬피나

비어와 병용투여를 권장하지 않습니다.

이 약으로 1년이상 장기간 치료시에는 정기적으로 검사를 받습니다.

장기간 사용시 엉덩이, 손목, 척추골절이 보고된 바 있으므로 저용량으로 단기간 사용할 것을 권장하며, 장기간 사용할 경우 칼슘과 vitamin D 복용을 추천합니다.

2년 이상 장기간 사용 시 비타민 B12가 결핍될 수 있습니다.

#### 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

#### 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

#### 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.