



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

vildagliptin

### 2. 효능

(경구용 혈당강하제)

혈중 당의 농도에 반응하여 인슐린의 생산을 촉진하고, 글루카곤의 생산을 억제하여 제 2형 당뇨병의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 1회 50mg, 1일 1~2회, 최대용량 1일 100mg(sulfonylurea와 병용시 1일 50mg)

○ 신장애 환자

1) 경증의 신장애 환자: 용량조절이 필요하지 않습니다.

2) 중등도 및 중증의 신장애 환자: 1회 50mg, 1일 1회

○ 간장애 환자

1) 이 약을 투여하기 전 간효소 수치가 정상 상한치의 2.5배를 초과하는 경우 투여를 권장하지 않습니다.

이 약은 음식과 상관없이 복용 가능합니다.

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

중증의 신장애/간장애, 유당불내성의 경우 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

저혈당, 췌장염, 알러지 반응

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 저혈당: 빈맥, 어지러움, 두통, 발한 등의 증상이 나타날 수 있으므로 사탕을 소지하고 다니도록 합니다.
- 췌장염: 복통, 요통 등의 심한 통증이 나타나면 즉시 의사에게 알리도록 합니다.
- 간기능 이상: 간염을 포함한 간기능 이상이 나타날 수 있으므로 복용 후 첫 1년간은 3개월마다 간기능 검사를 권장하며, 복용 후 구역, 구토, 피로, 짙어진 소변색, 피부나 눈에 황달이 나타나는지 관찰할 필요가 있습니다.

○ 다음과 같은 증상이 과량 투여 시 나타날 수 있습니다.

저혈당 증세(빈맥, 어지러움, 두통, 발한)

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

## 6. 주의해야 할 약물과 음식

○ 약물

sulfonylurea,  $\beta$ -agonist, levothyroxine, thiazide diuretics

○ 음식

음주에 의해 이약의 혈당강화작용이 강화되고 지속될 수 있습니다.

## 7. 사용 시 주의사항

제1형 당뇨병에서는 이 약이 효과를 나타내지 못하므로 사용하지 않습니다.

이 약을 투여하기 전 간효소 수치가 정상 상한치의 2.5배를 초과하는 경우 투여를 권장하지 않습니다.

췌장염 병력이 있었던 환자에서는 주의하여 사용합니다.

갑자기 복용을 중단하면 증상이 악화될 수 있으므로 의사와 상의 없이 투여를 중단하지 않습니다.

## 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

## 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

## 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.