

## 고령자를 위한 복약안내

### 1. 성분명

ciprofloxacin

### 2. 약품

씨록정

(시프로플록사신)

### 3. 효능

(퀴놀론계 항생제)

항균작용을 통해 균에 의한 각종 감염증을 치료하는 약

### 4. 주의사항

E03 (위장장애가 나타날 수 있어요)

I05 (카페인·알코올 X)

I01 (유제품 X)

P03 (자외선을 피하세요)

### 5. 복약안내

복용법, 복용기간을 환자 임의로 변경하는 경우, 항생제에 내성이 생겨 감염이 재발할 수 있으므로 지시한 용법을 지킵니다.

제산제, 유제품, 칼슘, 철분에 의해 이 약의 흡수가 감소하므로 이 약 투여 1~2시간 전 또는 4시간 후에 복용합니다.

### 6. 고령자를 위한 안내

※ 어르신이 복용할 경우 건염, 건파열의 위험이 증가할 수 있으므로 부작용이 나타나는지 면밀히 살핍니다.

### 7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.