

## 고령자를 위한 복약안내

### 1. 성분명

famotidine

### 2. 약품

가스터정

(파모티딘)

### 3. 효능

(소화성궤양용제)

위산분비를 줄임으로써 위장관 질환을 치료하는 약

### 4. 주의사항

C04 (졸릴수 있어요)

I04 (카페인 X)

I06 (흡연·알코올 X)

E06 (발진이 생기면 전문가에게 알려주세요)

### 5. 복약안내

구강내봉해정의 경우 혀 위에 두고 녹여서 복용할 수 있습니다.

두통, 어지러움이 나타날 수 있으며 혼동이 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.

설사, 변비가 나타날 수 있으며 신생아가 사용할 경우 괴사성 장염이 나타날 수 있습니다.

### 6. 고령자를 위한 안내

없음

### 7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.