

고령자를 위한 복용안내

1. 성분명

nebivolol

2. 약품명

네비레트정

(네비보롤)

3. 효능

(혈압강하제)

심근수축력 및 혈압저하 작용으로 고혈압과 협심증을 치료하는 약

4. 주의사항

D16 (매일 같은 시간에 복용하세요)

C03 (어지러울 수 있어요)

E02 (천천히 일어나세요)

5. 복용안내

갑자기 복용을 중단하면 증상이 악화될 수 있으므로 의사와 상의 없이 복용을 중단하지 않습니다.

서맥(맥박 50-55회/분 이하)이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 고령자를 위한 안내

없음

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.