

고령자를 위한 복약안내

1. 성분명

pioglitazone

2. 약품

액토스정

(피오글리타존)

3. 효능

(당뇨병용제)

인슐린의 이용률을 증가시켜 제 2형 당뇨병을 치료하는 약

4. 주의사항

P17 (피임하세요)

I03 (알코올 X)

5. 복약안내

음식과 함께 또는 따로 복용할 수 있습니다.

다른 경구용 혈당강하제와 병용투여 시 저혈당(빈맥, 식은땀, 오심, 구토, 두통, 시각장애, 의식소실) 발현 가능성이 있어 주의가 필요합니다.

여성에게서 상완, 손, 발 등에 골절의 빈도가 증가될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

드물지만 심부전 증상, 시야흐림, 간기능 악화 증상, 혈뇨, 긴박뇨, 배뇨통 등이 나타날 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

6. 고령자를 위한 안내

※ 심부전이 있는 어르신이 복용할 경우 그 증상이 더 악화될 수 있으므로 추천하지 않습니다. 전문가의 판단에 따라 사용합니다.

7. 공통사항

※ 처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에는 항상 의사나 약사와 상담합니다. 여러 가지 약물을 임의로 병용 시 약효가 떨어지거

나 부작용이 증가할 수 있습니다.

※ 복용을 잊은 경우에는 생각난 즉시 복용하며, 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.