



## 전문가를 위한 상세 복약안내

### 1. 성분명

itopride

### 2. 효능

(위장관운동조절제)

위장관에서 도파민 수용체와 아세틸콜린 저해제를 억제하여 위장관 운동을 촉진함으로써 기능성 소화불량으로 인한 소화기증상(복부팽만, 상복부통, 식욕부진, 속쓰림, 구역, 구토)의 치료에 사용됩니다.

### 3. 용량 및 용법

정제

○ 성인

1) 소화기증상: 1회 50mg, 1일 3회

식전에 복용합니다.

### 4. 사용 전 의사나 약사에게 알려야 할 사항

이 약물 또는 구성성분에 과민반응이 있을 시 반드시 미리 알려야 합니다.

임신 또는 수유 중이거나 계획이 있다면 미리 알립니다.

위장관출혈, 기계적 막힘 또는 천공 등이 있어 위장관운동자극이 유해한 환자인 경우 미리 알립니다.

### 5. 이상반응 및 대처법

○ 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 즉시 의사나 약사에게 알립니다.

쇼크 및 아나필락시양증상(혈압저하, 호흡곤란, 후두부종, 두드러기, 창백, 발한), 과민증(발진, 발적, 소양감), 황달

○ 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- 구역, 설사, 변비, 복통, 타액증가 등의 위장장애가 나타날 수 있습니다.

- 두통, 어지러움이 나타날 수 있습니다.

- 여성형 유방, 유즙분비가 나타날 경우 의사나 약사와 상담합니다.

- 피로감, 가슴통증, 요통 등이 나타날 수 있습니다.

이 외에도 약물과 관련된 이상반응이 나타날 수 있습니다. 자세한 사항은 문헌을 참고합니다.

## 6. 주의해야 할 약물과 음식

### ○ 약물

항콜린제(Tiquizium Bromide, Scopolamine Butylbromide, Timepidium Bromide 등)와 병용하는 경우 소화관운동 억제작용으로 인해 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용간격을 두는 등 병용 시 주의합니다.

### ○ 음식

알려진 바 없습니다.

## 7. 사용 시 주의사항

이 약은 아세틸콜린의 작용을 증강하므로 항콜린제, 파킨슨치료제, 항우울제 등을 함께 복용할 경우 의사나 약사와 상담합니다.

소화기증상의 개선이 나타나지 않는 경우, 장기간에 걸쳐 사용해서는 안됩니다.

## 8. 복용을 잊은 경우

생각난 즉시 복용합니다. 만약 다음 복용시간에 가까운 경우(예를 들어, 투여 간격의 과반 시간이 지났을 경우)에는 기다렸다가 다음 복용시간에 복용합니다. 한 번에 두 배의 용량을 복용해서는 안됩니다.

## 9. 보관방법

열과 직사광선을 피하여 실온에 보관하며, 습기가 많은 곳(냉장고, 욕실, 싱크대 등)은 피합니다.

## 10. 공통사항

치과 수술을 포함한 다른 수술을 받아야 하는 경우 이 약을 복용하고 있음을 의사에게 알립니다.

처방약, 일반약, 영양제, 한약 등 새로운 약의 복용을 시작하기 전에 항상 의사나 약사와 상담합니다.